

IMPROVE studie

Bijeenkomst Asbestslachtoffers Vereniging Nederland


16-11-2017 NKI-AVL

Rob ter Heine, ziekenhuisapotheker – klinisch farmacoloog
Nikki de Rouw, ziekenhuisapotheker in opleiding – onderzoeker

Radboudumc

Pemetrexed

- Belangrijk geneesmiddel in de behandeling van niet-kleincellig longkanker en longvlieskanker (asbestkanker)
- Wordt via infuus toegediend
 - Dosering: 500mg/m²
 - Veelal iedere 3 weken
 - Alleen of in combinatie met platinum
- Wordt vooral uitgescheiden door de nieren
- Patiënten met slecht werkende nieren krijgen deze behandeling niet



Doel van het onderzoek

1. Behandeling mogelijk maken voor patiënten met verminderde werking van de nieren
2. Behandeling beter op de individuele patiënt afstemmen (goed effect en zo min mogelijk bijwerkingen)




Wat houdt meedoen in?

- Onderzoek 1
 - Patiënten die een verminderde nierfunctie hebben (nieren werken minder goed)
 - Behandeling met pemetrexed in een lage, veilige dosering
- Onderzoek 2
 - Patiënten die behandeld gaan worden met pemetrexed
 - Dosering berekend op lichaamsoppervlak of berekend of op nierfunctie
- Een aantal uren langer in het ziekenhuis verblijven
- Verzamelen bloedmonsters en urinemonsters



Tijdlijn



Patiëntenverenigingen

- Perspectief van de patiënt vinden we erg belangrijk!!

Werkgroep met (vertegenwoordiging van) patiëntverenigingen



Deelnemende centa

Radboudumc

Jeroen BOSCH  ZIEKENHUIS

Erasmus MC

Universitair Medisch Centrum Rotterdam



ANTONI
VAN
LEEUWENHOEK 
NEDERLANDS KANKER INSTITUUT

 Maastricht UMC+